

сюжетный балет, насыщенный действием. Он постоянно обогащал лексику классического танца элементами бытового и эстрадного танца, свободной пластики и фольклора.

В балетном наследии Д.А. Брянцева заложено творческое и философское кредо хореографа, его танцевальный стиль и язык, которые сделали его философом танца.

Медицинские науки

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЙОДДЕФИЦИТА У НАСЕЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА Авдеева И.А., Конюхов В.А., Настека Н.Л. ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» Оренбург, Россия

Проведенный ретроспективный анализ йодной недостаточности в многолетней динамике в разрезе территориальных образований области, выявил существенные различия в формировании биологического ответа по отдельным территориям. При этом максимальные уровни во времени не всегда совпадают с региональными закономерностями, что с одной стороны согласуется с выводами о многофакторности причин йоддефицита, с другой – позволяет предложить новый подход к оценке максимальных уровней йодной недостаточности за все время регистрации этих множест-

венных влияний. Принципиально важно, что региональный критерий йодного дефицита $43,4 \pm 0,65\%$, рассчитанный на основе максимальных уровней достоверно ($p < 0,001$) превышает уровень $33,9 \pm 0,71\%$, рассчитанный в период отсутствия йодной профилактики, а частотная характеристика неонатального $ТТГ > 5ME/l$ в сельской местности $48,3 \pm 0,87\%$ достоверно превышает уровень городского $37,4 \pm 0,93$ ($p < 0,001$), что соответствует тяжелой степени дефицита в сельской в отличие от средней степени в городской. Необходимо подчеркнуть, что в период отсутствия йодной профилактики различия были статистически незначимы. Существенные различия выяснены и по географическим зонам (Таблица), причем, если в Северо-Западном и Восточном Оренбуржье выявлена тяжелая степень йоддефицита, то в Центральном – средней степени йоддефицит, что отличается от снижения с Запада на Восток в период отсутствия йодной профилактики.

Гигиеническая оценка максимальных уровней йоддефицита по географическим зонам по данным биомониторинга в %

Критерии оценки	Северо-запад		Центральное Оренбуржье		Восточное Оренбуржье	
	n	p±m %	n	p±m %	n	p±m %
Максимальный уровень	1643	50,7±1,2	2212	36,7±1,0	2112	44,7±1,1
t	3,7					
t*			9,0			
t**					5,4	

t – критерий достоверности разницы показателей между: t – Северо-западным и Восточным Оренбуржьем; t* – Северо-западным и Центральным Оренбуржьем; t** – Центральным и Восточным Оренбуржьем

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ НОВОРОЖДЕННЫХ.

Албегонова Ф.Д., Маргиева Д.А., Дудиев Р.В.,
Цориева А.М.

Северо-Осетинская государственная
медицинская академия
Владикавказ, Россия

Неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в нашей стране обусловлена многими факторами. При всей важности комплексного подхода к решению этой проблемы, как нам представляется, в системе факторов влияющих на демографическую ситуацию особое место занимает улучшение качественной и количественной структуры новорож-

денных. Между тем, место и роль качественной и количественной структуры новорожденных в системе расширенного воспроизводства населения до сих пор не изучена, как медицинской, так и социально-экономическими науками. Вместе с тем практическая реализация данной проблемы¹ возможна при достаточно полном ее теоретическом осмыслении.

В этой связи нами делается попытка исследовать факторы, влияющие на качественную и количественную структуру новорожденных.

Для изучения данной проблемы нами проанализированы статистические данные, ха-

¹ Улучшение качественной и количественной структуры новорожденных.