*«Актуальные проблемы науки и образования»,
Куба (Варадеро), 20–31 марта 2015 г.*

Исторические науки

**СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ИРАНЕ (1941–1943)**

Оришев А.Б.

*Институт Бизнеса и дизайна, Москва,
e-mail: orishev71@mail.ru*

В августе 1941 г. в Иран с целью пресечения деятельности германской агентуры и организации военных поставок СССР от союзников по антигитлеровской коалиции были введены части Красной Армии [2]. Режим Реза-шаха Пехлеви, проводивший политику модернизации и имевший тесные связи с нацистской Германией, был свергнут [3].

С приходом Красной Армии в Иране была развернута мощная пропаганда. Одним из ее направлений было распространение соответствующей литературы. Еще до начала Иранской операции в местные магазины в незначительном количестве стали поступать «Техника молодежи», «Огонек», «Вокруг света», «Мурзилка», «Наука и техника». Из политической литературы в то время советским пропагандистам удалось доставлять журнал «Крокодил», так как иранская цензура не воспринимала его как политический [1]. После августа 1941 г. объемы поставок политической литературы резко возросли. Широкий размах приобрел книгообмен

между СССР и Ираном. Общий книгооборот достиг в 1942 г. 1500 книг.

Возрос интерес к советской литературе, посвященной борьбе народов СССР против гитлеризма. Была переведена на фарси и издана в Тегеране книга советского военного корреспондента А. Полякова «В тылу врага». Повысился интерес и к русской классической литературе. Только за первый годы войны вышел на фарси ряд произведений М. Горького, Н. Гоголя, Ф. Достоевского. В иранских газетах стали печатать по частям произведения русских и советских писателей. В 1943 г. газета «Разм» стала публиковать роман «Мать» М. Горького, «Ажир» – «Дубровского» А.С. Пушкина, «Кушеш» – «Падение Парижа» И. Эренбурга. Газета «Иран джаван» приступила к печатанию отрывков из книги Л. Толстого «Оборона Севастополя». Печатались труды советских лидеров. Вышла в свет «Великая Отечественная война Советского Союза» И. Сталина.

Список литературы

1. АВП РФ. Ф. 94. 1941. Оп. 26. П. 332а. Д. 53. Л. 31.
2. Оришев А.Б. В августе 1941-го. Сер. 1418 дней Великой войны. – М.: Вече, 2011.
3. Оришев А.Б. Особенности модернизации Ирана при Реза-шахе Пехлеви // Восток. Афро-Азиатские сообщества: история и современность. – 2009. – № 6. – С. 74.

Медицинские науки

**ОТОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА**

Гюсан А.О., Салпагарова Ф.Э.

*Медицинский институт Северо-Кавказской
государственной гуманитарно-технологической
академии, Черкесск, e-mail: gujsan@mail.ru*

Демографические изменения в последние годы характеризуются увеличением числа лиц пожилого и старческого возраста. Сложилась устойчивая тенденция к росту продолжительности жизни.

Для лиц пожилого и старческого возраста характерно более широкое, в сравнении с молодыми, распространение ишемической болезни сердца (ИБС). Это связано с увеличением у них частоты и тяжести атеросклеротического процесса, а также сдвигами в иммунной и эндокринных системах, нарушении липидного и углеводного обменов.

ИБС является в настоящее время одной из основных причин инвалидности и смертности. У пациентов пожилого возраста ИБС сочетается

ся, как правило, с атеросклерозом церебральных и брахиоцефальных артерий, что приводит к целому ряду заболеваний других органов и систем. В частности известно, что решающая роль в возникновении патологии ЛОР-органов у больных пожилого возраста принадлежит изменениям кровоснабжения в результате атеросклероза. Почти полвека назад морфологи установили, что орган слуха и его сосудистая система является единым целым и обусловлено это онтогенетическим развитием.

Целью нашего исследования явилось установление частоты отологической симптоматики у больных ИБС пожилого и старческого возраста и выявление взаимосвязи между патологией сердечно-сосудистой системы и органом слуха.

Объекты и методы исследования. Обследованию подвергнуты больные ИБС пожилого и старческого возраста, находившиеся на лечении в республиканской клинической больнице. Всего 62 больных в возрасте от 60 до 85 лет 29 мужчин и 33 женщины.

Все больные проходили общепринятый для данной категории пациентов кардиологический комплекс обследования, который был дополнен